Dr. Luis Enrique Carrillo García

**FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA SUPERIOR EN
PACIENTES EN HEMODIÁLISIS EN EL IAHULA EN EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 2012 Y MAYO
2013.**

www.bdigital.ula.ve

Trabajo Especial de Grado presentado por el Médico Cirujano Luis Enrique Carrillo García ante el Consejo de la Facultad de medicina de la Universidad de los Andes, como credencial de mérito para la obtención del grado de Especialista en Medicina Interna

Tutor: Dr. Raimondo Caltagirone

Especialista en Medicina Interna y en Cuidados Críticos y Terapia
Intensiva

Mérida, Venezuela, 2013

www.bdigital.ula.ve

Carrillo, L. 2013. **Frecuencia de hemorragia digestiva superior en pacientes en hemodiálisis en el IAHULA en el período comprendido entre febrero 2012 y mayo 2013** / Luis Enrique Carrillo García. 51 páginas.

Nombre del Tutor: Raimondo Caltagirone.

Trabajo Especial de Grado para optar al título de Especialista en Medicina Interna – ULA 2013.

Luis Enrique Carrillo García.

**FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA SUPERIOR EN
PACIENTES EN HEMODIÁLISIS EN EL IAHULA EN EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 2012 Y MAYO
2013.**

Esta tesis fue evaluada y aprobada para la obtención del título de
Especialista en Medicina Interna por la Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela 2013.

www.bdigital.ula.ve

Se dedica éste trabajo a:

A mis abuelos: Antonio Carrillo, Elsa de Carrillo y María García por ser pilar fundamental en todo lo que soy, en mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo y por sus enseñanzas perfectamente mantenidas a través del tiempo, aunque sé que desde el cielo lo siguen haciendo.

www.bdigital.ula.ve

Se agradece por su contribución para el desarrollo de ésta tesis a:

A la Ilustre Universidad de los Andes, por haberme formado como persona, como ser humano, como ciudadano, como Médico General y en ésta oportunidad como Especialista en Medicina Interna.

A los pacientes del IAHULA, ya que sin ellos no hubiese podido realizar éste trabajo.

Al Dr. Raimondo Caltagirone por apoyarme en la idea y por guiarme para la realización de la misma.

**FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA SUPERIOR EN PACIENTES EN
HEMODIÁLISIS EN EL IAHULA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
FEBRERO 2012 Y MAYO 2013.**

RESUMEN

Objetivo: Se planteó un estudio observacional analítico de tipo transversal con el fin de determinar la frecuencia de la hemorragia digestiva superior en pacientes que se encontraban en tratamiento de hemodiálisis en el IAHULA en el período comprendido de Febrero del 2012 a Mayo del 2013. **Metodología:** El universo estuvo conformado por 30 pacientes y fueron todos incluidos en la investigación. Los datos fueron recolectados en una ficha de recolección de datos previo consentimiento informado. Se aplicaron pruebas paramétricas y no paramétricas para el análisis estadístico de las variables. **Resultados:** Predominó el sexo masculino, mayores 60 años de edad. El 100% de los pacientes presentaron Hipertensión Arterial (HTA) y de ellos 53.3% también presentaron Diabetes Mellitus (DM). El principal síntoma fue la melena; al 80% de los pacientes se les realizó endoscopia digestiva superior (EDS) cuyo principal hallazgo fue úlcera gástrica. Se analizó el tiempo en el protocolo de hemodiálisis y el primer episodio de HDS y se obtuvo como media 6 años. **Conclusiones:** En este estudio se demuestra que la HDS tiene prevalencia elevada en pacientes con hemodiálisis con predominancia en el sexo masculino y mayor de 60 años, con un promedio de tiempo en protocolo de tratamiento de 6 años. La mayoría presentó HTA Y DM como comorbilidades asociadas y el principal hallazgo en la EDS fue la úlcera gástrica.

Palabras clave: hemodiálisis, hemorragia digestiva superior, endoscopia digestiva superior.

**FREQUENCY OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING IN PATIENTS
HEMODIALYSIS IAHULA IN THE PERIOD FROM FEBRUARY 2012 TO MAY 2013.**

ABSTRACT

Objective: An observational, descriptive, cross sectional study was performed, during the period of February 2012 and May 2013, with the aim of determine the frequency of upper gastrointestinal bleeding (UGIB) in patients who were on hemodialysis treatment IAHULA in this period. **Methodology:** The study groups consisted of 30 patients and were all included in the investigation. Data were collected on a data sheet emptying informed consent. We applied parametric and nonparametric tests for statistical analysis of the variables. **Results:** Predominant male 60 years older. 100% of patients had Arterial Hypertension and 53.3% also Diabetes Mellitus (DM). The main symptom was the mane, to 80% of patients underwent upper endoscopy whose main finding was gastric ulcer. We analyzed the time hemodialysis protocol and the first episode of upper gastrointestinal bleeding (UGIB) and obtained an average 6 years. **Conclusions:** This study shows that the UGIB has high prevalence in hemodialysis patients were predominantly male and older than 60 years with an average time on treatment protocol 6 years. Most had hypertension and DM as comorbidities and the upper endoscopy (UE) main finding was gastric ulcer.

Keywords: Hemodialysis, upper gastrointestinal bleeding, upper endoscopy.

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Distribución de frecuencias según edad y sexo de pacientes con HDS en Hemodiálisis. IAHULA. 2012-2013.	26
TABLA 2. Comorbilidad en pacientes con HDS en Hemodiálisis. IAHULA. 2012-2013.	27
TABLA 3. Comportamiento del consumo de medicamentos asociados con la HDS en los pacientes en estudio. IAHULA. 2012-2013.	29
TABLA 4. Comportamiento de las cifras de hemoglobina, urea y creatinina al inicio y control. . IAHULA. 2012-2013.	30
TABLA 5. Hallazgos diagnósticos en la EDS de pacientes con HDS en hemodiálisis. IHAULA. 2012-2013.	33

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. Distribución de frecuencias según el género	26
GRÁFICO 2 . Distribución de frecuencias según el tiempo en protocolo de Hemodiálisis. IAHULA. 2012-2013	28
GRÁFICO 3. Distribución de frecuencias según síntomas de HDS. IAHULA. 2012-2013	31
GRÁFICO 4. Porcentaje de pacientes de la muestra con Endoscopía Digestiva Superior realizada. IAHULA. 2012-2013	32

www.bdigital.ula.ve

ABREVIATURAS

IAHULA: Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.

HDS: Hemorragia digestiva superior.

EDS: Endoscopia digestiva superior

IRCT: Insuficiencia renal crónica terminal.

LES: Lupus eritematoso sistémico.

DM: Diabetes mellitus.

HTA: Hipertensión arterial.

IBP: Inhibidores de bomba de protones.

www.bdigital.ula.ve

INDICE DE CONTENIDO

Portada	01
Ficha Catalográfica	02
Hoja de aprobación	03
Dedicatoria	04
Agradecimientos	05
Resumen	06
Abstract	07
Lista de tablas	08
Lista de gráficos	09
Abreviaturas	10
Lista de contenido	11
Introducción	14

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Formulación del problema	15
Justificación	16
Antecedentes	17
Objetivos	20
Tipo de investigación	21
Población y muestra	21
Variables	22
Materiales y métodos	23
Análisis estadístico	24
Aspectos éticos	25
Resultados	26
Discusión	35
Conclusiones	38
Recomendaciones	39

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Bibliografía	40
Anexos	42
Glosario	47

www.bdigital.ula.ve

INTRODUCCIÓN

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) es un problema de salud pública a nivel mundial, debido al continuo incremento en el número de pacientes tanto en países desarrollados como en desarrollo. Como consecuencia cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de reemplazo de la función renal como la diálisis que conlleva además al incremento de otras particularidades atribuibles a este subgrupo de pacientes, como son el aumento en la proporción de pacientes mayores de edad, con mayor supervivencia, además de las comorbilidades médicas que traen consigo, por lo cual son continuos usuarios de los servicios de atención médica, tanto ambulatoria como de urgencia.

En este contexto, las complicaciones gastrointestinales de éstos pacientes, así como el resto de complicaciones que pudieran aparecer, son más prevalentes, siendo imperativo y necesario conocerlas para aportar la más apropiada conducta terapéutica. Parte importante de este conocimiento implica la caracterización de las principales lesiones endoscópicas del tracto digestivo superior que aparecen en éstos pacientes, en especial en nuestro medio. Por este motivo, el presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar cuáles son las lesiones del tracto digestivo superior más frecuentemente encontrados, mediante endoscopia digestiva superior (EDS) en los pacientes con falla renal terminal.

La hemorragia digestiva superior es sumamente frecuente y su etiología es multifactorial. Las causas son: la gastritis erosiva, la úlcera duodenal, la duodenitis, la úlcera gástrica, las várices esofágicas y el síndrome de Mallory-Weiss.

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Los mecanismos propuestos incluyen alteraciones de la gastrina sérica, de la secreción ácida gástrica, de la barrera mucosa, el uso de fármacos ulcerogénicos (AINES), la infección por H. pylori y los trastornos de la hemostasia, ya sea por defecto plaquetario o bien por el uso de heparina en la hemodiálisis. Es posible que las lesiones angiodisplásicas que se describen en la literatura, tanto del tracto digestivo alto como bajo, no sean más frecuentes que en la población general; sin embargo se diagnostican con mayor frecuencia por su mayor tendencia al sangrado. Las telangiectasias gástricas también son causa de hemorragia digestiva superior en pacientes urémicos. El tratamiento de la hemorragia digestiva superior es el mismo que para los pacientes no urémicos, teniendo en cuenta que siempre el tratamiento farmacológico se debe ajustar al grado de insuficiencia renal.

www.bdigital.ula.ve

FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA EN ESTUDIO

En la actualidad, en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en el estado Mérida, Venezuela, se desconoce la incidencia de hemorragia digestiva superior (HDS) de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) en hemodiálisis, por lo que se hace necesaria la realización de un proyecto de investigación científica, que permita responder a esta problemática, que puede ser de utilidad en el manejo de estos pacientes.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) ocasiona alteraciones a nivel sistémico, y entre ellas, las relacionadas al aparato digestivo manifestadas por sintomatología variada y responsable de significativa morbi-mortalidad. El objetivo principal del estudio fue determinar las alteraciones endoscópicas del tracto digestivo superior más frecuentes en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRCT)

La limitada información que existe acerca del diagnóstico endoscópico de los pacientes con IRCT en hemodiálisis con HDS hace que este tipo de estudios sea de particular interés. En este contexto, se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar la frecuencia de la hemorragia digestiva superior en pacientes que se encontraban en protocolo de Hemodiálisis. La misma se llevó a cabo en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes durante el periodo comprendido entre Febrero del 2012 a Mayo del 2013.

ANTECEDENTES

En España, en 1993 Roca y cols estudiaron 66 pacientes que hicieron hemorragias digestivas de 824 que entraron en hemodiálisis en un período de 14 años. La presentación clínica fue hematemesis, melenas o rectorragias. Se les realizó estudios de EDS y de colonoscopia. El resultado fue que predominó el sexo masculino con un 68.2% (45), la edad media promedio fue de 54 años y el tiempo de permanencia en diálisis fue de 4 años. Los hallazgos endoscópicos más frecuentes encontrados en éste grupo de pacientes fue la gastritis erosiva (21.4%) y la úlcera duodenal (21.4%). El 66% de los episodios se resolvieron con tratamiento médico.

En el año 1996, en Barquisimeto Venezuela en la Universidad CentroOccidental Lisandro Alvarado, Sánchez Westudió la frecuencia de lesiones endoscópicas del tracto digestivo superior en pacientes urémicos en tratamiento con tres modalidades diferentes, hemodiálisis (H.D.) diálisis peritoneal ambulatoria crónica (D.P.A.C.) y tratamiento médico (no dialítico). Los tres grupos estudiados totalizaban 27 pacientes, distribuidos de la siguiente forma: 11 pacientes en H. D, 9 en D. P. A. C. y 7 en tratamiento médico, todos estaban en control médico en los Servicios de Medicina Interna y Nefrología del Hospital "Antonio María Pineda" de la ciudad de Barquisimeto. El estudio, de tipo prospectivo, fue realizado entre los meses de Noviembre de 1993 y Julio de 1994. La selección de los pacientes fue realizada al azar. Los tres grupos estudiados no diferían de forma significativa en cuanto a edad, sexo, sintomatología digestiva previa, enfermedad concomitante o datos paraclínicos (hemoglobina, hematocrito, urea, creatinina, calcio, fósforo, sodio y potasio sérico). Todos los pacientes fueron sometidos a endoscopia digestiva superior, encontrándose que las lesiones más frecuentes fueron la úlcera

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

duodenal y la lesión gastro-duodenal. Pudo concluirse que, las lesiones gastroduodenales son muy frecuentes en los pacientes urémicos y que la endoscopia digestiva superior debería realizarse de forma periódica y regular a todos los pacientes urémicos, aún en aquellos sin síntomas digestivos previos.

En Perú para el año 2007 Chacaltana y cols realizaron la investigación “Lesiones Endoscópicas del Tracto Digestivo Alto en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, estudiaron 54 pacientes. La edad promedio fue 73.2 años, siendo más frecuente en varones con una relación M/F de 1.45. La población tenía en promedio 32 meses de diagnóstico de IRCT y valores promedio de urea y creatinina sérica en 94.4 mg/dl y 3.9 mg/dl respectivamente. Sólo el 37.1% de los pacientes fueron sintomáticos. La indicación más frecuente del estudio endoscópico fue la hemorragia digestiva superior (29.6%). Los hallazgos endoscópicos más frecuentes fueron las erosiones gástricas (35.2%), eritema parcelar antral (27.8%), úlcera gástrica (24.1%) y erosiones duodenales (18.5%). El diagnóstico histopatológico predominante fue la gastritis crónica superficial (65.8%).

Cheung y cols en el 2010 en Canadá estudiaron los sangrados digestivos se ven afectados de manera adversa en pacientes con ERC terminal. Con un total de 150 pacientes con enfermedad úlcero-péptica (EUP), se dividieron en 3 grupos cada uno con 50 pacientes. Los grupos fueron: IRCT en hemodiálisis, ERC y pacientes con función renal normal. Las tasas de resangrado global para los pacientes IRCT en hemodiálisis fue de 38%, para la ERC de 14%. El resangrado por alto riesgo de EUP fue de 40.6% en los pacientes con IRCTD y de 19.4% para los otros dos grupos.

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

El número de transfusiones fue elevado para el grupo en diálisis con un promedio de 6 unidades de concentrado globular. El tiempo de hospitalización fue mayor en los pacientes en diálisis que en el grupo normal con un promedio de 34 días.

www.bdigital.ula.ve

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1 Objetivo General:

Determinar la frecuencia de la Hemorragia Digestiva Superior en pacientes que se encontraban en protocolo de Hemodiálisis en el IAHULA en el período comprendido entre Febrero del 2012 a Mayo del 2013

2Objetivos Específicos:

1. Caracterizar la muestra en estudio según las variables demográficas sexo y edad.
2. Identificar las comorbilidades asociadas con HDS en la muestra en estudio.
3. Describir la asociación entre el consumo de medicamentos AINES, esteroides, antiagregantes plaquetarios y la aparición de la HDS.
4. Determinar los principales síntomas de HDS en la muestra en estudio.
5. Identificar los principales hallazgos al examen EDS.
6. Determinar el tiempo de protocolo de Hemodiálisis y el primer episodio de HDS.
7. Analizar el comportamiento de la cifras de exámenes paraclínicos de hemoglobina, urea y creatinina.
8. Precisar la severidad de la HDS según variables clínicas.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es un estudio de tipo observacional descriptivo, analítico, de corte transversal; con el fin de determinar la frecuencia de la Hemorragia Digestiva Superior en pacientes que se encontraban en protocolo de Hemodiálisis en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (I.A.H.U.L.A) durante el período de Febrero del 2012 a Mayo del 2013.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Estuvo conformada por la totalidad de 30 pacientes en Hemodiálisis, tratados por el Servicio de Nefrología del IAHULA, que presentaron Hemorragia Digestiva Superior (HDS) durante el período de la investigación, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión:

- ✓ Pacientes, de ambos sexos, mayores de 18 años de edad.
- ✓ Con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis que presentaron Hemorragia Digestiva Superior
- ✓ Consentimiento para participar en el estudio (Ver anexo 1).

Criterios de exclusión:

- ✓ Menores de 18 años.
- ✓ Portadores de coagulopatías.
- ✓ No consentimiento.

SISTEMA DE VARIABLES

Variable independiente:

Hemorragia Digestiva Superior

Variables dependientes:

Niveles de Hemoglobina, creatinina y urea

Momento del protocolo de hemodiálisis en que se presenta la HDS

Severidad de la HDS

Comorbilidades asociadas

Hallazgos en la EDS

Variable explicativa

Enfermedad Renal Crónica estadio V en Hemodiálisis

Variable Interviniente:

Consumo de AINES, esteroides

Variables demográficas:

Edad y género.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para asegurar los resultados óptimos de la investigación, todos los aspectos relacionados con las condiciones externas de los estudios, en lo referente a equipos y personal encargado de su manipulación se encontraron estandarizados, en particular los relacionados con la realización de la endoscopia digestiva superior (HDS) ya que se tuvo en cuenta que todas fueran realizadas en el IAHULA, con el fin de lograr la homogeneidad en los criterios de diagnóstico al igual que las pruebas de laboratorio se realizaron todas en el IAHULA.

La primera actividad de la investigación consistió en la recolección de pacientes. Se obtuvo el consentimiento informado (Anexo 1) y se completó el instrumento de recolección de datos (Ver anexo 2), el cual recogió en la primera y segunda partes los datos personales, exámenes de laboratorio. En la tercera parte se recogió el resultado del examen endoscópico

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se planteó un tipo de estudio observacional analítico de corte transversal, a partir de la información recogida en el instrumento diseñado, se creó una base de datos con utilización del programa SPSS 20.0 que permitió realizar el análisis estadístico descriptivo. Para la prueba de hipótesis y el análisis de las variables se aplicaron pruebas estadísticas paramétricas:

- ✓ Para las variables cualitativas el Chi Cuadrado χ^2 y para la diferencia de medias x y desviación estándar s el *t Student* en variables cuantitativas.
- ✓ Además se realizó el análisis de varianza factorial (ANOVA).

www.bdigital.ula.ve

Se consideró significativo un valor de $p \leq 0.05$. Los resultados se presentan en tablas para facilitar la comprensión de la información obtenida.

ASPECTOS ÉTICOS

Con la autorización de la Coordinación de los Postgrados de Medicina Interna y Nefrología, se solicitó en forma verbal y escrita a los pacientes su consentimiento o el de sus familiares, para participar en la Investigación, se les explicó detalladamente las características y finalidad del estudio.

Cumpliendo con los principios éticos de la Declaración de Helsinki, durante la realización de este estudio el paciente no fue expuesto a riesgo a pesar de que el método endoscópico es invasivo pero inocuo para el paciente. En relación con la toma de muestra de sangre para determinar valores de urea y creatinina se le explicó al paciente que la punción es ligeramente dolorosa y que se realizó cumpliendo con las normas de asepsia y antisepsia. Además el riesgo de complicaciones sería mínimo, tales como: flebitis o celulitis en el sitio de punción y el paciente inmediatamente recibiría tratamiento médico.

RESULTADOS

Las principales características de los 30 pacientes estudiados se detallan a continuación.

GRÁFICO 1. Distribución de la frecuencia según el género.

En el gráfico 1 podemos ver claramente que el sexo de mayor prevalencia en éste estudio fue el género masculino con un 60 % (18) en comparación con el género femenino en un 40 % (12).

TABLA 1. Distribución de frecuencias según edad y sexo de pacientes con HDS en Hemodiálisis. IAHULA. 2012-2013.

EDAD	MASCULINO		FEMENINO	
	Nº	%	Nº	%
≤ 30	1	3.3	0	0
31-41	2	6.7	0	0
42-52	3	10	0	0
53-63	2	6.7	4	13.3
64-74	10	33.3	8	26,7
≥75	0	0	0	0
Total	18	60	12	40

En la tabla 1 se observa que existió un predominio del sexo masculino 60% sobre el femenino 40% con diferencias estadísticamente significativa con una $p=0.0012$ al aplicar el t de student para diferencia de dos medias.

En relación a la edad existió un marcado predominio de la HSD en pacientes mayores de 64 años de edad con un 60% de la muestra y la media de la edad en ese grupo fue de 68 años.

TABLA 2. Comorbilidad en pacientes con HDS en Hemodiálisis. IAHULA. Mérida. 2012-2013

Comorbilidad	Nº	%
Hipertensión arterial (HTA)	10	33.3
HTA y Diabetes Mellitus	16	53.3
HTA y Arritmias cardíacas	1	3.3
HTA y LES	1	3.3
HTA y Otras	2	6.7
Total	30	100

En la tabla 2 se analizó la comorbilidad y destaca que los 30 pacientes presentaron HTA para un 100% dentro de ese grupo 53,3% también eran diabéticos.

GRÁFICO 2. Distribución de frecuencias según el tiempo en protocolo de Hemodiálisis. IAHULA. 2012-2013.

Se observa que $n=7$ (23,3%) llevaba 6 años en protocolo de hemodiálisis para el comienzo del primer episodio de HSD con una media a los 5,73 años.

TABLA 3. Comportamiento del consumo de medicamentos asociados con la HDS en los pacientes en estudio. IAHULA. 2012-2013.

Consumo de medicamentos asociados con HDS	Nº	%
<i>Consumo de AINES:</i>		
Ibuprofeno	6	20
Diclofenac	2	6,7
Aspirina	2	6,7
Total consumo de AINES	10	33,3
Consumo de Clopidogrel	0	0
Consumo de esteroides	0	0
No consumo	20	66,7
Total	30	100

En contraposición a lo esperado la mayoría de estos pacientes (20) no consumía medicamentos asociados con la HDS como son los AINES y los antiagregantes plaquetarios. Solamente 10 pacientes (33,3%) consumió AINES (predominó el ibuprofeno). El análisis multivarianza fue estadísticamente significativa la diferencia entre los dos grupos $p=0,00011$, con marcada tendencia hacia el bajo consumo de estos tipos de medicamentos, lo que puede deberse a que son pacientes de larga data en hemodiálisis que manejan y controlan adecuadamente el consumo de los mismos.

TABLA 4. Comportamiento de las cifras de hemoglobina, urea y creatinina al inicio y control. .
IAHULA. 2012-2013.

Variable	Inicio		Control		Valor de <i>p</i>
	<i>X</i>	SD	<i>X</i>	SD	
N=30					
Cifras de					
Hemoglobina mg/dl	7,63	2,57	7,78	2,25	0,031
Urea	178,26	56,97	158,82	48,79	*0.00
Creatinina	5,28	8,29	4,636	2,13	*0.00

Nota: Estadísticamente significativo $p \leq 0.05$ *

Se aplicó el test estadístico de Wilcoxon para analizar muestras pares relacionadas y se obtuvo para las cifras de urea y creatinina un valor de *p* estadísticamente significativo. En cambio para los niveles de hemoglobina existió un leve ascenso que no fue significativo a pesar de que el 50% (15) se transfundieron con al menos 1 unidad de concentrado globular.

GRÁFICO 3. Distribución de frecuencias según síntomas de HDS. IAHULA. 2012-2013.

El 100% de los pacientes de la muestra en estudio presentaron síntomas sugestivos de HDS, como principal síntoma, el más frecuente fue la melena en 56.6% (17), con diferencias estadísticamente significativas al aplicar el análisis multivarianza ANOVA para la diferencia de medias entre más de dos grupos con un valor de $p = 0.0021$, seguido por hematemesis en un 36.7% (11) de los casos, como principal síntoma y por último sangrado en borra de café solo en dos pacientes (6.6%).

GRÁFICO 4. Porcentaje de pacientes de la muestra con Endoscopia Digestiva Superior realizada. IAHULA. 2012-2013.

En el gráfico 4 se muestra que solo al 80% de los pacientes se les realizó la EDS y los hallazgos se presentan a continuación.

TABLA 5. Hallazgos diagnósticos en la EDS de pacientes con HDS en hemodiálisis. IHAULA.

Mérida. 2012-2013

Hallazgos endoscópicos	Nº	Porcentaje*
n=24		
Úlcera gástrica	18	75
Úlcera duodenal	3	12,5
Gastropatía erosiva	3	12,5
Gastropatía urémica	0	0
Cáncer gástrico	0	0
Desgarro de Mallory-Weiss	0	0
Otras	0	0
Total	24	100

Nota: Porcentaje* calculado en base al total de pacientes con EDS

En la tabla 5 se observa que el hallazgo más frecuente fue la úlcera gástrica en 18 pacientes que representaron un 75%, seguido por úlcera duodenal en 3 pacientes y gastropatía erosiva en otros 3.

En nuestro estudio se le aplicó la clasificación endoscópica Forrest para úlcera gastroduodenal sólo a 5 pacientes, de los cuales 4 eran Forrest III y 1 era ForrestIIa.

DISCUSIÓN

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) es un síndrome con manifestaciones clínicas muy variadas que afecta a la mayor parte de órganos y sistemas, lo cual es un reflejo de la complejidad de las funciones que el riñón desempeña en condiciones fisiológicas, así como de las severas consecuencias que ocasiona la disfunción renal. La IRCT constituye un problema de salud pública mundial, con una incidencia y prevalencia crecientes, pronóstico pobre y alto costo. Las alteraciones a nivel sistémico que ocasiona, y entre ellas, las relacionadas al aparato digestivo son manifestadas por sintomatología variada siendo responsable de significativa morbi-mortalidad que conllevan, éstos pacientes empeoran el pronóstico de las complicaciones que pudieran presentar, siendo éstas comorbilidades más prevalentes tanto en frecuencia como en número conforme pasan los años, lo cual se aprecia claramente en nuestra investigación al encontrar que los antecedentes médicos estaban presentes en el 100% de la población evaluada, además de presentarse en mayor cantidad, la Diabetes Mellitus, debido principalmente al mayor porcentaje de pacientes con edad avanzada encontrado en nuestro estudio como responsables de la nefropatía, así como efectos secundarios debido a las complicaciones propias de la uremia. En la presente investigación, los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) estudiados con endoscopia digestiva superior tenían un promedio de 6 años de diagnóstico de IRCT y por ende, igual tiempo de hemodiálisis; así como valores promedio de urea sérica en 94.4 mg/dl (23-197 mg/dl) y creatinina sérica en 3.9 mg/dl (1.2-11.8 mg/dl).

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Estos valores caracterizan a la población estudiada en pacientes urémicos con hemodiálisis de largo plazo, por lo que puede resultar difícil atribuir los resultados del presente estudio únicamente al estado urémico, debido al tiempo prolongado de la sustitución dialítica en éstos pacientes, la cual se considera en teoría que reduce la incidencia y severidad de las alteraciones propias del estado urémico que es objeto de discusión en este contexto.

Al evaluar la presencia de sintomatología digestiva alta, encontramos que el 100% de los casos fueron sintomáticos digestivos al momento de la endoscopia digestiva superior con predominio de la melena como el más frecuente. Este hallazgo no concuerda con estudios semejantes, como el realizado por otros autores, quienes encontraron durante un examen de endoscopia digestiva de rutina previo al trasplante renal que el 73.8% de pacientes con IRCT eran asintomáticos, siendo los síntomas más frecuentes la náusea (12.6%), pirosis (8.7%) y dolor abdominal (7.3%). Estos resultados si nos hacen pensar que, si bien se conoce que las manifestaciones gastrointestinales son frecuentes en éstos pacientes no siempre se correlacionan con sintomatología de HDS.

Se conoce bien que los pacientes con IRCT tienen mayor riesgo de presentar hemorragia digestiva superior, debido a alteración de la función plaquetaria secundaria a la uremia, menor aclaramiento de la gastrina sérica, el uso de heparina durante la hemodiálisis y la polifarmacia que generalmente tienen estos pacientes.

En cuanto a los hallazgos endoscópicos encontrados en este estudio, resaltan las úlceras gástrica y duodenal como las lesiones endoscópicas más frecuentes con una prevalencia de 35.2%, lo cual coincide con lo encontrado por Cheung Yeu. y cols con 34.5%; siendo mayor que la prevalencia encontrada por Zuckerman GR.

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Es importante mencionar además, que las erosiones gástricas fueron la segunda causa responsable de los cuadros de HDA en éstos pacientes.

Chacaltana A. y cols en su investigación, realizada en Perú, concluyeron que las alteraciones endoscópicas del tracto digestivo superior más frecuentes en los pacientes con IRCT fueron las erosiones gástricas, eritema parcelar antral, úlcera gástrica y erosiones duodenales. Los resultados de este grupo de investigadores coinciden por los encontrados en nuestra investigación.

En éste estudio pudimos ver que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los niveles de hemoglobina a pesar de que el 50% (15) de los pacientes se transfundieron con 01 unidad de concentrado globular. También podemos apreciar que por ser la EDS un procedimiento de emergencia en éstos pacientes no se les pudo aplicar la clasificación endoscópica de Forrest para las úlceras gastroduodenales, siendo realizada solo a 5 pacientes, siendo ésta de suma importancia porque nos habla de pronóstico y riesgo de resangrado.

CONCLUSIONES

- ✓ Predominó el sexo masculino y mayores 60 años de edad.
- ✓ El 100 % (30) de los pacientes presentaron Hipertensión Arterial (HTA) y de ellos 53.3% (16) también presentaron Diabetes Mellitus (DM).
- ✓ El principal síntoma en éste estudio fue la Melena,
- ✓ Al 80% de los pacientes se les realizó endoscopia digestiva superior cuyo principal hallazgo fue la úlcera gástrica.
- ✓ Se analizó el tiempo en el protocolo de hemodiálisis y el primer episodio de HDS y se obtuvo como media 6 años.

www.bdigital.ula.ve

RECOMENDACIONES

Realizar EDS a todo paciente que presente sangrado digestivo que se encuentre en protocolo de hemodiálisis.

Realizar EDS a todo paciente en protocolo de hemodiálisis que se encuentre en el grupo de edad de riesgo como lo es en el decenio de 64 a 74 años de edad, ya que fue el grupo más vulnerable en nuestro estudio.

Aplicar la clasificación endoscópica de Forrest para las úlceras gastroduodenales, ya que nos aportan información con respecto al pronóstico y al riesgo de resangrado.

Profundizar en el estudio de estos pacientes a fin de identificar las posibles causas de HDS.

Utilizar inhibidores de bomba de protones (IBP) ya que el hallazgo endoscópico más frecuente fue la úlcera gástrica de probable etiología medicamentosa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Molina Infante J. et al. Avances en el tratamiento farmacológico de la hemorragia digestiva de origen oscuro. *Rev EspEnferm Dig (Madrid)* 2007; 99 (8): 457-62.
2. Manabe N, Tanaka S, Fukumoto A, Nakao M, Kamino D, Chayama K. Double balloonenteroscopy in patients with GI bleeding of obscure origin. *GastrointestEndosc* 2006; 64: 135-40.
3. Lai LH, Wong GL, Chow DK, Lau JY, Sung JJ, Leung WK. Long term follow up of patients with obscure gastrointestinal bleeding after negative capsule endoscopy. *Am J Gastroenterol* 2006; 101: 1224-9.
4. Hadithi M, Heine GD, Jacobs MA, van Bodegraven AA, Mulder CJ. A prospective study comparing video capsule endoscopy with double-balloon enteroscopy in patients with obscure gastrointestinal bleeding. *Am J Gastroenterol* 2006; 101: 52-7.
5. Matas JL, Asteinza M, Loscos JM, Fernández S, RamírezArmengol JA, Díaz Rubio M. Diagnostic yield and safety of capsule endoscopy. *RevEspEnfermDig* 2006; 98: 666-73.
6. Pérez Cuadrado E, Mas P, Hallal H, Shanabo J, Muñoz E, Ortega I, et al. Double-balloon enteroscopy: A descriptive study of 50 explorations. *Rev EspEnferm Dig* 2006; 98: 73-81
7. Zuckerman GR, Cornette GL, Clouse RE y cols: Upper gastrointestinal bleeding in patients with chronic renal failure. *Ann Intern Med* 108: 588, 2011.
8. Sánchez W. Lesiones endoscópicas del tracto digestivo superior en pacientes urémicos. Trabajo de Tesis. Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. 1996
9. Chacaltana A et al. Lesiones Endoscópicas del Tracto Digestivo Alto en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal. *RevGastroenterol Perú*; 2009; 27: 246-252
10. Sharma R, Gorbien MJ: Angiodysplasia and lower gastrointestinal tract bleeding in elderly patient. *Arch Intern Med* 165: 807-811, 2005.
11. Cheung Yeu. Et al Peptic ulcer bleeding outcomes adversely affected by endstage renal disease. *Gastrointestinal Endosc* 2010: 71: 449

12. Anitha B, Toke. Gastrointestinal bleeding risk in patients undergoing dialysis. *GastrointestEndosc* 2010; 71: 50-52
13. Sravanthi P, Udayakumar N, Arun R et al. End-stage renal disease is associated with worse outcomes in hospitalized patients with peptic ulcer bleeding. *Gastrointestinal Endosc.* 2013; 77: 609-615
14. Crooks C, West J, Card T. comorbidities affect risk of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. 2013; 144: 1384-1393
15. Felix J. Obscure gastrointestinal bleeding in chronic renal failure. *GE J Port Gastroenterol* 2013; 20(3); 95-96.
16. Lanas A, Bajador E, Serrano P et al. Nitrovasodilators, low-dose aspirin, other nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and the risk of upper gastrointestinal bleeding. *NEJM.* 2000. 343(12); 834-839.
17. Yang JY, Lee TCh, Montez-Rath M et al. Risk factors of short-term mortality after acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in patients on dialysis: a population-based study. *BMC Nephrology* 2013 14:97: 1-8.
18. WengCh, Shu KH, TangDCh et al. In-hospital mortality risk estimation in single episodic upper gastrointestinal bleeding patients undergoing hemodialysis: a retrospective cohort study. *Acta Nefrológica* 2012; 26(3); 143-148.
19. Roca R, Ramirez M, Segarra A. Hemorragia digestiva en pacientes en hemodiálisis periódica. *Nefrología* 1993; XIII(3).

www.bdigital.ula.ve
ANEXOS

ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Participante Menor de Edad o Discapacitado

En el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes se está realizando un proyecto de investigación **“FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA SUPERIOR EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS EN EL IAHULA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 2012 Y MAYO 2013”** con el objeto de: Determinar la frecuencia de la Hemorragia Digestiva Superior en pacientes que se encontraban en protocolo de Hemodiálisis en el IAHULA en el periodo comprendido entre Febrero del 2012 a Mayo del 2013.

Yo, _____, con número de cédula de identidad: _____, Nacionalidad _____ Estado civil: _____
Representante legal de: _____ C.I: _____.

Siendo mayor de edad, en uso pleno de mis facultades mentales y sin que medie coacción ni violencia alguna, en completo conocimiento de la naturaleza, forma, duración, propósito, inconvenientes y riesgos relacionados con el estudio que más abajo indico, declaro mediante la presente:

1. Haber sido informado de manera objetiva, clara y sencilla, de todos los aspectos relacionados con este trabajo de investigación y tener conocimiento claro de los objetivos del mismo.
2. Conocer bien el protocolo expuesto por el investigador, en el cual se establece que como representante legal debo dar mi consentimiento para la participación de mi representado, la cual consiste en :
Tomar muestras sanguíneas y realización endoscopia digestiva superior.
3. Que la participación de mi representado en dicho estudio no tiene riesgo para su salud.
4. Que los datos obtenidos durante el estudio guardan carácter confidencial.
5. Que la información obtenida de la investigación, sobre mi representante, me será notificada por el equipo investigador responsable.
6. Que cualquier pregunta que yo tenga en relación con este estudio, me será respondida oportunamente por parte de la responsable de la investigación Dr. Luis E Carrillo, teléfono 0414-159.66.31, residente del postgrado de Medicina Interna del IAHULA, quien usará la información obtenida para cumplir con su Trabajo Especial de Grado, o por

7. el Dr. Raimondo Caltagirone, teléfono 0414-374.27.20 adjunto del servicio de Medicina Interna.

DECLARACIÓN DEL VOLUNTARIO.

Luego de haber leído, comprendido y recibido las respuestas a mis preguntas con respecto a éste formato de consentimiento:

1. Acepto las condiciones estipuladas en el mismo y a la vez doy mi consentimiento al equipo de investigadores a realizar las evaluaciones ya descritas.
2. Me comprometo a colaborar con el cumplimiento de las indicaciones por parte de mi representado.
3. Me reservo el derecho de revocar este consentimiento y donación en cualquier momento sin que conlleve algún tipo de consecuencia negativa para mi representado.

Nombre: _____ C.I. N° _____

Representante legal de: _____ C.I. N° _____

En Mérida a los _____ días del mes de _____ del 2013.

Firma del representante

Firma del representado

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR

Luego de haber explicado detalladamente al Sr. (a) _____, representante legal del (a) _____ paciente: _____, la naturaleza del proyecto mencionado, certifico mediante la presente que, a mi leal saber, el sujeto que firma este formulario de consentimiento comprende la naturaleza, requerimientos, riesgos y beneficios de la participación de su representado en éste estudio.

Por el equipo de Investigación:

Responsable: Dr. Luis E Carrillo C.I: V- 13.584.187 Firma: _____

Tutor : Dr. Raimondo Caltagirone C.I.:V-__ Firma: _____

En Mérida, a los _____ días del mes de _____ del año 2013.

Anexo 2

ANEXO 2. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

“FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA SUPERIOR EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS EN EL IAHULA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 2012 Y MAYO 2013”

Código

--	--	--	--	--	--

Fecha de la encuesta

Día		Mes		Año	

Historia clínica

--	--	--	--	--	--

Cédula de Identidad	E					
V						

Variables demográficas:

Nombre y apellidos: _____

Dirección: _____

Tel (habitación) _____ Teléfono (Célular) _____

Tel (Padres) _____

1.- Género (GÉNERO)

1.1 Masculino	1
1.2 Femenino	2

2.- Edad

3.- Comorbilidad

3.1 HTA _____

3.2 DM _____

3.3 Arritmias cardiacas _____

3.4 LES _____

3.5 Otras _____

4. Síntomas de HDS

4.1 Hematemesis _____

4.2 Sangrado en Borra de café _____

4.3 Melena _____

5.-Tiempo en protocolo de Hemodiálisis (En años)

6.-Química sanguínea

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

- 6.1 Leucocitos (LEUC)
- 6.2 Segmentados (SEG)
- 6.3 HB (Hb)
- 6.4 HTO (HTO)
- 6.5 PLAQUETAS (PLAQ)
- 6.6 UREA (URE)
- 6.7 CREATININA (CREAT)

7. Grado de severidad de la hemorragia

- 7.1 Leve
- 7.2 Moderada
- 7.3 Severa

	0
	1
	2

8.- Endoscopia Digestiva Superior

Realizada: 1. Si _____ 2.No _____

9. Hallazgos HDS

- 9.1 Úlcera gástrica _____
- 9.2 Úlcera duodenal _____
- 9.3 Gastropatía erosiva _____
- 9.4 Gastropatía urémica _____
- 9.5 Cáncer gástrico _____
- 9.6 Desgarro de Mallory-Weis _____
- 9.7 Otras _____

www.bdigital.ula.ve

GLOSARIO

www.bdigital.ula.ve

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Enfermedad Renal Crónica: Es la disminución progresiva e irreversible de la tasa de filtración glomerular (TFG) sostenida por un período de más de 3 meses con la consecuente retención de azoados.

Hemodiálisis: Es el procedimiento por medio del cual la sangre del paciente se hace circular por un filtro para extraer los desechos urémicos mediante una máquina para hemodiálisis.

Síndrome Urémico: Es el resultado de los efectos tóxicos derivados de las concentraciones elevadas de los productos nitrogenados y de otros productos de desechos de la sangre.

Hemorragia Digestiva: Es la pérdida sanguínea a través del tracto gastrointestinal (TGI) ya sea de manera aguda o crónica y se puede presentar como: hematemesis, vómitos en “borra de café”, melenas, hematoquezia o rectorragia.

Úlcera Gástrica o Duodenal: Es un defecto de la mucosa gastrointestinal que se extiende a través de la *muscularismucosae* y que permanece como consecuencia de la actividad de la secreción del jugo gástrico.

Desgarro de Mallory Weiss: Consiste en una o varias laceraciones longitudinales de la unión esofagogástrica, habitualmente como consecuencia de vómitos. Se presenta en forma de hematemesis de sangre fresca después de haber presentado vómitos alimentarios o biliosos.

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Lesión de Dieulafoy: Se caracteriza por la presencia de una arteria anómala de calibre grueso que atraviesa la submucosa del estómago y discurre en contacto con la mucosa, por lo que pequeñas roturas de ésta capa pueden ocasionar la erosión de la arteria y la consiguiente hemorragia. Suele localizarse en el fundus o cuerpo gástrico y se manifiesta típicamente por una hemorragia masiva intermitente.

Ectasia Vascular: Son lesiones que se caracterizan por la presencia de agregados de máculas rojas que se disponen en forma lineal en el antro del estómago.

Clasificación de Forrest: Es una clasificación endoscópica que se utiliza para el pronóstico y terapéutica.

Clasificación	Estigmas
Forrest I	Hemorragia activa Ia: Hemorragia arterial en chorro. Ib: Hemorragia venosa en capa o goteo.
Forrest II	Estigmas de hemorragias recientes. IIa: Vaso visible en el fondo de la úlcera. IIb: Coágulo adherido a la base de la úlcera. IIc: Base cubierta de hematina.
Forrest III	Úlceras sin estigmas de sangrado.

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA...

Gastropatía Urémica: Se define como la inflamación de la mucosa gástrica que se caracteriza por la presencia de erosiones y hemorragia. Es ocasionada por la acción tóxica con daño metabólico de la célula gástrica con alteraciones de la permeabilidad, retrodifusión de hidrogeniones, necrosis, erosiones y hemorragias subepiteliales.

Melena: Es un signo clínico que refleja una hemorragia digestiva por la presencia de deposiciones negruzcas, fétidas (por la sangre digerida). Es casi siempre manifestación de una hemorragia digestiva alta copiosa.

Hematemesis: Vómitos con sangre fresca, no digerida, normalmente abundante, provocado por una distensión del estómago; por sangre procedente de una hemorragia del estómago, duodeno o del esófago.